Otalgie & surdité, [illegible]

Une Dame de 60 & quelques années, qui avoit eu d'abord [illegible], avoit [illegible] sa vie d'une santé assez chancelante. Ses maladies commençoient communément d'ordinaire par un assoupissement qui étoit suivi du délire. Elle étoit encore [illegible] quil lui vint un petit ulcere près du point lacrymal supérieur ; cet ulcere guérit. Elle devint dans la suite fort sujette aux vapeurs. Elle avoit surtout la tête très-délicate. Elle perdit ses regles à cinquante ans ; & depuis ce temps-là sa sensibilité avoit encore augmenté. Sa principale incommodité cependant étoit une douleur d'oreille accompagnée d'un tintement, qui lui rendoit le plus petit bruit insupportable : ce tintement étoit continuel, mais quelquefois il devenoit plus fort. Il lui survint une espece de mal de gorge, les amygdales se gonflerent ; en même temps on remarqua qu'elle avoit beaucoup de peine à entendre, & elle sentoit, disoit-elle, comme quelque chose qui lui bouchoit le conduit de l'oreille. On soupçonna des matieres amassées ; mais quoiqu'on les eût ôtées, la malade n'entendoit pas mieux. On lui prescrivit un gargarisme pour son mal de gorge : elle s'apperçut que ce remede diminuoit en même temps son mal d'oreille. L'auteur en conclut que la cause en étoit un embarras dans la trompe d'Eustache.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 62 d 8 n°161

Surdité : ses causes. Zodiacus Gallicus, ann. 1681. mens. august. observ. 4.

On me presenta un homme qui n'entendoit ni d'un coté ni de l'autre. Je reconnus par son exposé, que sa surdité dépendoit de quelques ordures qui prenant de la consistance, s'étoient collées à la membrane du tambour; accident qui se rencontre fort souvent. Je lui injectai alternativement dans les oreilles de l'huile de lin, puis d'une décoction émolliente. Il sortit, le cinquième jour, du fond de l'oreille gauche, un corps plâtreux, de couleur jaune, et de la grosseur d'une moitié de haricot. Je répétai l'injection le soir du même jour, et il sortit de la même oreille un autre corps de la même consistance que le premier, mais d'un volume à peu près double. Le malade sentit une vive douleur au moment où je le tirai, et il vint quatre ou cinq gouttes de sang, apparemment parceque cette concrétion étoit encore trop adhérente au fond de l'oreille. Au reste l'ouïe revint de ce côté, aussi délicate qu'elle étoit avant que le malade eût commencé à devenir sourd. Il sortit de l'oreille droite beaucoup moins de matière, et par cette raison cette oreille n'a pu reprendre ses fonctions aussi parfaitement que la gauche.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE